

## Zimování hus běločelých (*Anser albifrons*) v centrech měst Železného Brodu a Hradce Králové

*Wintering of the White-fronted Geese (Anser albifrons) in the Železný Brod and Hradec Králové city centers (North–Eastern Bohemia)*

Karel Bejček,<sup>(1)</sup> Ladislav Jasso<sup>(2)</sup> & Paweł T. Dolata<sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Brožíkova 620, 500 12 Hradec Králové; e-mail: kkbejcek@post.cz

<sup>(2)</sup> Proseč 25, 513 01 Semily; e-mail: Jasso.L@seznam.cz

<sup>(3)</sup> Południowowielkopolska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, ul. Wrocławska 60 A/7, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polsko; e-mail: p.dolata@op.pl

Počty hus běločelých (*Anser albifrons*) přezimujících v Evropě jsou v poslední době odhadovány na 1,1 milionů jedinců. Z toho v České republice zimovalo v letech 1990–2000 asi jeden až 30 tisíc jedinců podle klimatických podmínek v jednotlivých zimách (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2004). Husy běločelé se často vyskytují společně s husami polními (*Anser fabalis*), kterých zimuje v České republice asi pět až 80 tisíc jedinců. Vzhledem k tomu, že jde o lovný druh (doba lovu v ČR je od 16. srpna do 15. ledna; vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb.), jsou husy velmi plaché a obvykle se nepřibližují k lidem. Pozorování hus běločelých nejčastěji pochází z volné krajiny – z polí a velkých vodních ploch (např. VRÁNA & BĚLKA 2006, 2007), tedy z míst typických pro zimní výskyt těchto ptáků. Zcela chybí pozorování hus běločelých (nebo i polních) v českých městech (viz HUDEC 1994), a to i z pravidelně sčítaných tradičních zimovišť vodních ptáků na řekách (BERGMANN 2002, HAMPL & VÁCLAVEK 2003, SYCHRA 2005, VRÁNOVÁ *et al.* 2007). V tomto příspěvku popisujeme tři pozorování husy běločelé na řekách ve městech severovýchodních Čech.

První pozorování pochází z řeky Jizery v Železném Brodě (kvadrát 5357, 50°39'N 15°17'E, nadmořská výška 314 m). Město leží v hlubokém údolí a je obklopeno kopcovitým terénem. Dne 26. října 2006 byla na řece ve městě pozorována mladá husa běločelá (*ssp. A. a. albifrons*) společně s husou polní. Pták dobře létal a v době zimních povodní v lednu 2007 se krátkodobě zdržoval mimo město. V centru města byl pozorován opakovaně, často v hejnu kachen divokých (*Anas platyrhynchos*) a odletěl až 8. dubna 2007. Další dvě mladé husy běločelé se objevily na stejném místě 8. listopadu 2007. Přezimovaly opět v centru města, kde se často pásly na trávníku u jediného mostu přes Jizeru. Věk jsme určili podle naznačené bílé skvrny nad zobákem a chybějícího tmavého pruhování spodiny těla. Husy nebyly plaché, ale ani zcela důvěřivé – jejich úteková vzdálenost (před příchodem pozorovatelem odplouvaly) byla asi 10–15 m a krmení od lidí téměř nepřijímaly. Tyto husy byly naposledy pozorovány 12. dubna 2008.

Další pozorování pochází z řeky Labe v Hradci Králové (kvadráty 5760/5761, 50°13'N 15°50'E, nadmořská výška 230 m). Dne 12. ledna 2008 byla při zimním sčítání vodních ptáků v centru Hradce Králové (Smetanovo nábřeží) pozorována jedna mladá husa běločelá a od 20. ledna 2008 byly na

stejném místě přítomny dvě mladé husy běločelé (opět *ssp. A. a. albifrons*). Jejich určení bylo potvrzeno více ornitology. Husám chyběly tmavé pruhy na spodině těla a bílá skvrna nad zobákem. Husy se vyskytovaly v uvedeném místě pravidelně; jejich přítomnost byla kontrolována v cca tří denních intervalech. Poslední pozorování je z 24. dubna 2008. Poté už husy na Labi pozorovány nebyly. Husy se zdržovaly v hejnech kachen divokých (max. cca 100 ex.), labutí velkých (*Cygnus olor*; max. cca 80 ex.), a lysek černých (*Fulica atra*; max. cca 80 ex.). V březnu a dubnu klesly počty labutí na 3–18 jedinců, zmenšovaly se i počty kachen i lysek. Vodní ptáci jsou zde krmeni lidmi; husy běločelé se krmení pravidelně účastnily a také se často pásly na trávníku podle řeky. Byly ostražitě, ale jejich minimální vzdálenost od člověka se postupně zmenšovala z cca 20 m až na méně než 2 m. Stačil ale prudší pohyb či výkřik lidí a husy okamžitě odplouvaly do větší vzdálenosti. Ke konci svého pobytu odlétaly na pole severně od místa výskytu a vracely se zpět. Husy se zdržovaly na Labi až do 24. dubna 2008. Všechny pozorované husy byly plně vzletné a nebylo na nich pozorováno žádné viditelné zranění (např. postřelení). Taktéž nebyly označeny kroužky, což zvyšuje pravděpodobnost, že se nejednalo o uprchlíky ze zajetí. Vždy se jednalo o mladé ptáky. Pozorované zimování ve městech může být počátkem urbanizace tohoto druhu, k jaké došlo ve druhé polovině dvacátého století např. u labutí velkých (HILPRECHT 1970, HORA 1984, 1985, 1991, WIELOCH 1984, HUDEC 1994) a kachen divokých (ENGEL *et al.* 1988, HUDEC 1994, KONSTANTINOV *et al.* 1996, NOWICKI 2001) v druhé polovině dvacátého století.

Několik dalších pozorování hus běločelých v centrech měst je známo z Polska. Od 27. prosince 1973 do 2. ledna 1974 se mladá husa běločelá vyskytovala na Lužické Nise v centru Zhořelce (STAWARCZYK 1981), další opět mladí ptáci zimovali jednotlivě v listopadu a prosinci 1988 v parku Morskie Oko v centru Varšavy (NOWICKI 2001) a v lednu–březnu 1992 na Visle v Krakově (WALASZ 1993). V posledním případě se husa krmila na trávníku u řeky ve vzdálenosti 5–7 m od lidí. V polovině devadesátých let dvacátého století se jedna husa běločelá připojila k hejnu vodních ptáků (husa velká *Anser anser*, berneška velká *Branta canadensis*, husa polní) v ZOO v Poznani a přebývala tam několik sezón (Wysocki *in verb.*). V prosinci 1996 byla jedna husa běločelá pozorována na řece San v centru Přemyšle (Kunysz 1998, Kunysz *in verb.*).

## Souhrn

V tomto příspěvku popisujeme tři pozorování husy běločelé (*Anser albifrons*) na řekách v netypickém prostředí měst. Tento druh jsme dvakrát zaznamenali na řece Jizeře v Železném Brodě v období od 26. října 2006 do 8. dubna 2007 (1 ex.) a poté v období od 8. listopadu 2007 do 12. dubna 2008 (2 ex.). Další dvě husy běločelé byly společně zaznamenány na Labi v Hradci Králové v období od 20. ledna do 20. dubna 2008. Ve všech případech se jednalo o mladé, vzletné a zdravě vypadající jedince bez kroužků. Husy se misily s hejny dalších druhů zimujících vodních ptáků a částečně ztrácely plachost před lidmi.

## Summary

In this paper, we describe observations of the White-fronted Goose (*Anser albifrons*) in an unusual habitat of rivers in the city centers in North–Eastern Bohemia. We repeatedly recorded one individual of this species on Jizera river in Železný Brod city (50°39'N 15°17'E, altitude 314 m) during the period 26<sup>th</sup> October 2006 to 8<sup>th</sup> April 2007, and two individuals at the same place from 8<sup>th</sup> November 2007 to 12<sup>th</sup> April 2008. Other two individuals were observed on Labe river in Hradec Králové city (50°13'N 15°50'E, altitude 230 m) during the period 20<sup>th</sup> January to 24<sup>th</sup> April 2008. All five individuals were young, flight-worthy and healthy birds without rings. They joined the flocks of other waterfowl species and their partly lost the timidity against people.

## Literatura

- BERGMANN P. 2002: Změny v zimování vodních ptáků na Vltavě v Praze v poslední čtvrtině 20. století. *Sylvia* 38: 61–74.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. *BirdLife International, Cambridge*.
- ENGEL J., KELLER M., LESZKOWICZ J. & ZAWADZKI J. 1988. Synurbanization of the mallard *Anas platyrhynchos* in Warsaw. *Acta Ornithologica* 24: 9–28.
- HAMPL R. & VÁCLAVEK J. 2003: Zimování vodních ptáků na Labi v Pardubicích v letech 2000/2001–2002/2003. *Panurus* 13: 81–88.
- HILPRECHT A. 1970. Höckerschwan, Singschwan, Zwergschwan. Die Neue Brehm-Bücherei. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt.
- HORA J. 1984: Populace labutě velké (*Cygnus olor* Gmelin) v ČSSR v roce 1981. *Zprávy MOS* 42: 19–37.
- HORA J. 1985: Bestandssituation des Höckerschwans, *Cygnus olor*, in der ČSSR. *Beitr. Vogelkd.* 31: 93–103.
- HORA J. 1991: Základní informace o populaci labutě velké (*Cygnus olor* /Gm./) ve Východočeském kraji. *Panurus* 3: 89–106.
- HUDEC K. (ed.) 1994: Fauna ČR a SR, Ptáci 1. *Academia, Praha*.
- KONSTANTINOV V. M., NOWICKI W. & PICHURIN A. G. 1996: Recent changes in the avifauna of cities in European Russia and Eastern Poland – results of a questionnaire. *Acta Ornithologica* 31: 59–66.
- KUNYSZ P. 1998: Liczebność ptaków wodnych w okresie jesienno-zimowym na Sanie w Przemyślu. *Badania nad ornitofauną Ziemi Przemyśkiej* 6: 121–126.
- NOWICKI W. 2001: Ptaki śródmieścia Warszawy. *Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa*.
- STAWARCZYK T. 1981: Ptaki okolic Zgorzelca (woj. jeleniogórskie). *Notatki Ornitologiczne* 22: 3–17.
- SYCHRA J. 2005: Zimování vodních ptáků na brněnských řekách. *Crex* 25: 99–104.
- VRÁNA J. & BĚLKA T. (eds) 2006: Ornitologická pozorování. *Panurus* 15: 125–140.
- VRÁNA J. & BĚLKA T. (eds) 2007: Ornitologická pozorování. *Panurus* 16: 133–160.
- VRÁNOVÁ S., LEMBERK V. & HAMPL R. 2007: Ptáci Pardubic. *Východočeská pobočka České společnosti ornitologické a Východočeské muzeum v Pardubicích, Pardubice*.

- WALASZ K. 1993: Zimowanie gęsi zbożowej *Anser fabalis* i gęsi białoczelnej *Anser albifrons* na odcinku miejskim Wisły w Krakowie. *Remiz* 2: 92–93.
- WIELOCH M. 1984: Numbers and distribution of the Mute Swan *Cygnus olor* in Poland against the situation of this species in Europe. *Acta Ornithologica* 20: 187–240.

ISSN 1211-6424

ISBN 978-80-87151-02-0

**+ foto v barevné příloze**

**Obr. 1:** Husy běločelé (*Anser albifrons*) na Labi v centru Hradce Králové dne 20.1.2008. Foto L. Jasso.

**Fig. 1:** White-fronted Geese (*Anser albifrons*) on Labe river in the Hradec Králové city center on 20.1.2008. Photo by L. Jasso.