

Neobvyklé hnízdění sýkory modřinky (*Cyanistes caeruleus*) ve starém hnízdě jiříčky obecné (*Delichon urbica*) pod mostem

An unusual nesting of the Blue Tit (Cyanistes caeruleus) in an old nest of the House Martin (Delichon urbica) situated under the bridge

Ladislav Jasso

Proseč 25, 513 01 Semily; e-mail: Jasso.L@seznam.cz

Sýkora modřinka (*Cyanistes caeruleus*) žije téměř v celé Evropě s výjimkou severu Skandinávie a Ruska. U nás patří k nejhojnějším druhům ptáků; je běžná ve všech typech lesa, v parcích i zahradách včetně měst, v alejích podél silnic i břehových porostech kolem vod. Hnízdí dvakrát ročně od dubna do července a k hnízdění využívá různé dutiny. Z 221 československých hnízd bylo 142 v budkách, 49 v dutinách stromů a 30 hnízd na dvanácti dalších místech, např. v hromadách dřeva, ve škvírách zdí a v pařezech. Nalezena byla i hnízda v opuštěných hnízdech větších ptáků a veverek (HUDEC 1983). ŠÁLEK (1996) popisuje hnízdění sýkory modřinky ve starém hnízdě jiříčky obecné (*Delichon urbica*) pod balkonem vily v Hulíně (střední Morava). Z hnízda bylo tehdy vyvedeno pět mladých modřinek.

Na podobné neobvyklé hnízdění modřinek mě upozornil V. Šťastný z Turnova. Pod mostem přes řeku Jizeru u Ploukonic (kvadrát 5457, koordináty 50°35'N 15°08'E, nadmořská výška 240 m) objevil 20. května 2007 hnízdo modřinek ve starém hnízdě jiříčky. Okolí mostu bylo zarostlé převážně listnáči (vrby, topoly). Hnízdo bylo umístěno zespodu mostu asi pět metrů nad vodní hladinou. Při kontrole dne 23. května 2007 jsem pozoroval krmení mlád'at (viz foto v příloze). Rodiče v 5– až 10–minutových intervalech přinášeli mlád'atům převážně housenky a moje přítomnost pod hnízdem jim vůbec nevadila. Starých hnízd jiříček bylo pod mostem několik, ale nebyla obsazena. Osud hnízdění nebyl zjištěn. Pozorování doplňuje dříve publikované údaje o místu k hnízdění u sýkory modřinky (HUDEC 1983) a společně s nimi svědčí o velké přizpůsobivosti sýkor při výběru místa k hnízdění. Lokalitu jsem opět navštívil 14. června 2008 a ve stejném starém hnízdě jiříček opět hnízdily sýkory modřinky. V této době intenzivně krmily mlád'ata. Přibližně 5 m od nich přímo nad hlavním proudem řeky Jizery krmil mlád'ata ve starém hnízdě vlaštovky obecné (*Hirundo rustica*) pár lejsků šedých (*Muscicapa striata*).

Souhrn

V roce 2007 bylo pod mostem přes řeku Jizeru u Ploukonic (okres Semily) zjištěno hnízdění sýkory modřinky (*Cyanistes caeruleus*) ve starém hnízdě jiříčky obecné (*Delichon urbica*). V roce 2008 bylo pozorováno hnízdění sýkory modřinky na stejném místě a opodál hnízdil lejsk šedý (*Muscicapa striata*) ve starém hnízdě vlaštovky obecné (*Hirundo rustica*).

Summary

In 2007, I recorded nesting of the Blue Tit (Cyanistes caeruleus) in an old nest of the House Martin (Delichon urbica). The nest was situated under the bridge over Jizera river near Ploukonice village (Semily district, 50°35'N 15°08'E, altitude 240 m). In 2008, Blue Tits nested in the same nest, while the Spotted Flycatcher (Muscicapa striata) nested in an old nest of the Barn Swallow (Hirundo rustica) at the distance approximately 5 m.

Literatura

HUDEK K. (ed.) 1983: Fauna ČSSR, Ptáci III/2. *Academia Praha*

ŠÁLEK P. 1996: Zajímavé hnízdění sýkory modřínky (*Parus caeruleus*). *Ptáci kolem nás* 2/1996: 27–28

ISSN 1211-6424

ISBN 978-80-87151-02-2

+ foto v barevné příloze