

Vodouš štíhlý (*Tringa stagnatilis*) poprvé zastižen v Českém ráji

The first observation of the Marsh Sandpiper (Tringa stagnatilis) in the Bohemian Paradise region

Ladislav JASSO

Proseč 25, 513 01 Semily; e-mail: jasso.l@seznam.cz

Vodouš štíhlý (*Tringa stagnatilis*) má palearktický typ rozšíření. V době hnízdění vyhledává stepi a lesostepi severně od Černého a Kaspického moře a na východ až po 85. poledník. V poslední době hnízdí v evropské části areálu výskytu v malém počtu nepravidelně ve Finsku, Pobaltí a Polsku. Je to tažný druh, který zimuje v Africe jižně od Sahary, v oblasti Perského zálivu, v Indii, Indonésii a v Austrálii.

V České republice se vodouš štíhlý vyskytuje vzácně v době jarního i podzimního tahu, zejména na jižní a střední Moravě (HUDEC & ŠTASTNÝ 2005). V Čechách je jeho výskyt nepravidelný až velmi vzácný, nejvíce záznamů výskytu pochází z jižních Čech (KLOUBEC *et al.* 2015). Ve východních Čechách byl tento druh pozorován do roku 2015 osmkrát (ŽĎÁREK 1987, ČSO 2016), z toho čtyřikrát na údolní nádrži Rozkoš (okres Náchod, mapovací kvadrát 5662), dvakrát na sedimentačních nádržích cukrovaru v Českém Meziříčí (okres Rychnov nad Kněžnou, mapovací kvadrát 5762) a dvakrát na rybnících u Opatova (okres Svitavy, mapovací kvadrát 6164). První dvě východočeská pozorování vodouše štíhlého pocházejí z Rozkoše (11. 8. 1973, 24.–26. 4. 1982; ŽĎÁREK 1987), později se začali vodouši štíhlí v regionu objevovat po dlouhé nepřítomnosti až po roce 2002 (ČSO 2016). V Českém ráji nebyl vodouš štíhlý dosud zjištěn (MRKÁČEK 2000).

Dne 21. 7. 2015 jsem pozoroval vodní ptáky v přírodní památce Ostruženské rybníky na Jičínsku (katastr obcí Ostružno, Ohaveč a Březina, mapovací kvadrát 5557, koordináty 50°46' N 15°31' E, nadmořská výška 268 m n. m.). Z důvodu dlouhodobě panujícího sucha se na okrajích malého rybníku Turecká (rozloha 2,2 ha) obnažil podél rákosí 1–2 m široký pás bahna. Na něm se zdržovalo pět čejek chocholatých (*Vanellus vanellus*), pět bekasin otavních (*Gallinago gallinago*), dva vodouši bahenní (*Tringa glareola*) a jeden juvenilní vodouš štíhlý (*Tringa stagnatilis*). Téměř po celou dobu pozorování krácel v mělké vodě a lovil hmyz (obr. 1). Na lokalitě se tento jedinec zdržel do 24. 7. 2015 (ČSO 2016).

SOUHRN

Příspěvek popisuje první pozorování vodouše štíhlého (*Tringa stagnatilis*) v oblasti Českého ráje. Jeden juvenilní pták se zdržoval ve dnech 21.–24. 7. 2015 na rybníku Turecká (okres Jičín) v přírodní památce Ostruženské rybníky (mapovací kvadrát 5557, koordináty 50°46' N 15°31' E, nadmořská výška 268 m n. m.).



Obr. 1: Žlutá šipka označuje mladého vodouše štíhlého (*Tringa stagnatilis*) na břehu rybníka Turecká (okres Jičín), 21. 7. 2015. Foto: Ladislav Jasso.

Fig. 1: Yellow arrow indicates position of juvenile Marsh Sandpiper (*Tringa stagnatilis*) at Turecká fishpond (Jičín district), 21st July, 2015. Photo by L. Jasso.

SUMMARY

*This article describes first observation of Marsh Sandpiper (*Tringa stagnatilis*) in the Bohemian Paradise region. The juvenile bird was registered during period from 21th July to 24th July 2015. It was foraging at the mud bank of Turecká pond (area 2,2 ha) near town of Jičín (district of Jičín, Grid No. 5557, altitude 268 m a.s.l.).*

LITERATURA

ČSO 2016: *Birds.cz – pozorování ptáků*. Dostupné on-line na <http://www.birds.cz/avif>.

Naposledy navštíveno 21. 7. 2016.

HUDEC K. & ŠTASTNÝ K. (eds) 2005: *Fauna ČR – Ptáci II/2*. Academia, Praha.

KLOUBEC B., HORA J. & ŠTASTNÝ K. (eds) 2015: *Ptáci jižních Čech*. Jihočeský kraj, České Budějovice.

MRKÁČEK Z. 2000: *Ptáci Českého ráje*. ZO ČSOP Křižánky, Křižánky.

ŽDÁREK P. 1987: Ptactvo údolní nádrže Rozkoš. *Sborník Východočeské pobočky Československé ornitologické společnosti* 9: 1–102.