

## PŘÍSPĚVEK K HNÍZDNÍMU ROZŠÍŘENÍ SKORCE VODNÍHO (*Cinclus cinclus*) V ORLICKÝCH HORÁCH

### On dipper's (*Cinclus cinclus*) nesting in Orlické mountains

Jiří REJL

V monografii Příroda Orlických hor a Podorlicka uvádí SKLENÁŘ (1980) výskyt skorce vodního (*Cinclus cinclus*) na všech větších říčkách a potocích Orlických hor. Podrobně se hnízdním rozšířením tohoto pěvce zabývali BĚLKA, HROMÁDKO a ŠREIBR (1991), kteří při zjišťování jeho výskytu prakticky nevynechali žádný významný tok.

Při svých návštěvách Orlických hor se věnuji výzkumu avifauny v údolí potoka Bělidlo (k.ú. Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou, čtverec síťového mapování 6456a). Bělidlo pramení pod Vrchmezím v nadmořské výšce 955 m a délka jeho toku je asi 4 km. Je pravostranným přítokem Olešenky, do které se vlévá v Olešnici v Orl. horách v nadmořské výšce 620 m.

25. srpna 1993 jsem pozoroval u kamenného mostku (nadm. výška 730 m) vzdáleného asi 800 m od chaty Klárovky adultního jedince skorce vodního. 3. června 1994 jsem asi 50 m pod jmenovanou chatou chytil do 3 m dlouhé sítě dospělého ptáka. 8. července 1994 jsem na téma místo odchytil samici s nažinou a druhý den 9. července plně vzletlé mláď. Odchytové místo je vzdáleno vzdušnou čarou od nejbližšího objeveného hnízda na Olešence asi 2 km. Skorec vodní je v době hnízdění teritoriálním ptákem. HUDEC (1964) uvádí velikost teritoria podle BALÁTA (1964) na Adamovském potoce 504 - 714 m. ŠTASTNÝ a kol. (1987) uvádějí sídelní hustotu více než 1 páru na 1 km toku. BĚLKA a kol. (1991) vzhledem k získaným údajům stanovili hustotu na všech zkoumaných tocích 1 páru na 7,25 km. Vzhledem k témtu a dalším skutečnostem (např. nález dvou hnízd s mláďaty ve vzdálenosti 150 m od sebe - BĚLKA a kol., 1991), lze předpokládat, že skorec vodní na potoce Bělidlo hnizdí.

### SOUHRN

V roce 1994 bylo zjištěno hnízdění skorce vodního (*Cinclus cinclus*) na potoce Bělidlo u Olešnice v Orlických horách (okres Rychnov nad Kněžnou).

### SUMMARY

Nesting of the bird was proved on the Bělidlo brook near Olešnice in Orlické mountains in 1994.

## LITERATURA

- BALÁT, F., 1964: Breeding biology and population dynamics in the Dipper. Zool. listy, 13: 305-320.
- BĚLKA, T., HROMÁDKO, M., ŠREIBR, O., 1991: Hnízdní rozšíření skorce vodního (*Cinclus cinclus*) v Orlických horách. Panurus, 3: 193-198.
- HUDEC, K., et al., 1983: Fauna ČSSR. Ptáci 3/I. Academia, Praha: 388-395.
- SKLENÁŘ, J., 1980: Příroda Orlických hor a Podorlicka. Ptáci. SZN, Praha: 615-633.
- ŠŤASTNÝ, K., RANDÍK, A., HUDEC, K., 1987: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha: 280-281.

## ADRESA AUTORA:

Mgr. Jiří Rejl  
Agentura ochrany přírody a krajiny  
Boženy Němcové 2625  
530 02 Pardubice