

Husa indická (*Anser indicus*) v okrese Pardubice

Occurrence of the Bar-headed Goose (*Anser indicus*) in Pardubice district (Eastern Bohemia)

Jiří Veselý⁽¹⁾ & Jiří Rejl⁽¹⁾

⁽¹⁾ Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice e-mail: aopkpardubice@centrum.cz

Husa indická (*Anser indicus*) nazývaná také husa tibetská (GOSLER 1994) je palearktickým druhem. Obývá okolí stepních jezer a řek ve střední Asii v nadmořských výškách 4000 – 5000 m, kde hnízdí na skalních útesech. Hromadná zimoviště leží v nízko položených bažinách na severu Indie (BEJČEK & ŠTASTNÝ 1999). V Evropě se stala ve 20. století oblíbeným chovatelským druhem. Jedinci uniklí z chovů dali vznik hnízdícím populacím v některých evropských státech. Ve Švédsku hnízdí od roku 1930, v Norsku hnízdily v roce 1994, hnízdění je uváděno také v Holandsku (SNOW & PER-RINS 1998). BEAMAN & MADGE (1998) uvádějí další hnízdění v Německu a Československu.

Několik pozorování husy indické je uváděno také z regionu východních Čech (MILES 1975, CHÝTIL 1994, MACH 2000, KOLLERT 2000).

Dne 11.4.2001 první z autorů pozoroval v 16,30 hod. na louce mezi rybníkem Baroch a obcí Hrobice ve skupině cca 20 hus velkých dva jedince s nápadným černobílým zbarvením hlavy a krku a určil je jako husu indickou.

Ještě téhož dne v 17,15 hod. oba autoři pozorovali na stejném místě oba jedince a determinaci potvrdili podle PETERSONA et al. (1993). Jednalo se o dva dospělé ptáky, pro které je charakteristické zbarvení hlavy a krku: černá páska od oka přes příuší, černá skvrna v týlu, vše při pohledu z boku, zezadu tyto skvrny vypadají jako dvě spojené černé čelenky nad sebou. U mladých ptáků toto výrazné zbarvení chybí. Husy indické mají černé zbarvení konců ručních letek, rýdovací pera jsou bílá. Zbarvením a velikostí jsou obě pohlaví shodná.

Popsané pozorování páru hus indických 11.4.2001 mezi PR Baroch a obcí Hrobice (okr. Pardubice) je dalším zástihem tohoto druhu v regionu východních Čech a prvním pozorováním druhu na okrese Pardubice (FK 94/2003).

Summary

On April 4th 2001 two individuals of the Bar-headed Goose (*Anser indicus*) were observed between Baroch pond and Hrobice village (Pardubice district, Eastern Bohemia). Both individuals were determined as adults according to the plumage colour on their heads and necks. This was the first record of this species in Pardubice district, however, it is not the first record in the Eastern Bohemia region.

Literatura

- BEAMAN M. & MADGE S., 1998: The Handbook of Bird Identification for Europe and the Western Palearctic. *Christopher Helm, London*.
- BEJČEK V. & ŠŤASTNÝ K., 1999: Encyklopedie ptáků. *Rebo Productions*.
- GOSLER A. (ed.), 1994: Atlas ptáků světa. *Příroda, Bratislava*.
- CHYTIL J., 1994: 4. zpráva Faunistické komise ČSO. *Zprávy ČSO*, 38: 46-47.
- KOLLERT M. in LEMBERK V. (ed.), 2000: Ornitologická pozorování. *Panurus*, 10: 141-147.
- MACH J., 2000: První výskyt husy indické (*Anser indicus*) v okrese Svitavy. *Panurus*, 10: 135-136.
- MILES P., 1975: Dřemlík tundrový (*Falco columbarius*) a husa indická (*Anser indicus*) v Krkonoších. *Prunella*, 1: 19.
- PETERSON R.T., MOUNTFORT G. & HOLLOM P.A.D., 1993: Birds of Britain & Europe. *HarperCollins Publishers, London*.
- SNOW D.W. & PERRINS C.M., 1998: The Birds of the Western Palearctic. *Oxford University Press, Oxford*.

ISBN 80-86046-72-9