

HANZE, O. - ZIMMERMANN, G.

Opeření přátelé (Překlad z německého originálu Gefiederte Freunde, BLV München, 1966) SZN Praha 1969

SOLOMON, M. E. - GLEN, D.M. - KENDALL, D.A. et al.

Predation of overwintering larvae of codling moth (Cydia pomonella) by birds

J. apple Ecol., Vol. 13, 1976, č. 2, s. 341 - 352

Čížek lesní (Carduelis spinus) vyhníždil na Bohdanečsku ?

Ladislav Štancl, Helga Štanclová

Čížek lesní náleží k těm druhům ptáků, kteří sice na Bohdanečsku pravidelně protahují a přezimují, ale dokladu o zahníždění a ani pozorování v době hnízdění není.

Jedinou možností zahníždění v dřívější době je pozorování MUSÍLKA (Ptactvo Pardubicka, str. 51), který viděl v parku v Bohdanči hejtnka až do 1. 5. 1933. Ještě 10. 5. t. r. zastihl 3 exempláře na školní zahradě a 30. 7. 1933 slyšel v parku vábení přeletujících ptáků.

Na jaře roku 1981 hnízdil neobvykle hojně na všech hnízdištích východních Čech. Všeude byly pozorovány desítky párů těchto ptáků již koncem dubna při stavbě hnízd. Na Bohdanečsku se držely skupiny přezimujících čížků do poloviny března (13. 3. 1981 vybírala menší skupinka semena smrku v nemocnici v Pardubicích). Později nebyli pozorováni, ale dne 5. 5. 1981 přiletěl sameček na volieru v Rohovládově Bělé.

S rodinkou mladých, kteří ještě byli krmeni rodiči, jsme se setkali 28. 6. 1981 ve starém, borovém lese u Bukovky. Tito ptáci se zde drželi celý den a proto předpokládáme, že zde v okolí vyhníždili.

O zahníždění v tomto prostoru svědčí i neobvykle časný zástih (normální tah probíhá v těchto místech koncem IX., až X.). Dne 16. 7. 1981 byl první pták na voliere v Rohovládově Bělé. Potom zde byli pozorováni již pravidelně (např. 9. 8. chycen juv. ex. v šatě mládí apod.). Podzimní tah čížků zde toho roku proběhl také velmi časně. Jeho začátek 5. 9. 1981 (několik ex. Rohovládeva Bělá) a vyvrcholení mezi 18. 9. - 3. 10. 1981. Později potom protahovali jenom v ojedinělých exemplářích.

Tato pozorování (jak pozorování rodinky 28. 6., tak i časně pozorování prvních mladých ptáků dne 16. 7.) předpokládá vyhníždění v tomto prostoru.